

◇定期予防接種一覧(平成30年4月時点)

★ の期間中であればいつでも接種可能ですが、できるだけ の標準的な接種年齢で受けましょう。

☆歳に至るまで ⇒ 誕生日の前日まで
☆歳に達するまで ⇒ 誕生日の前日まで
☆歳未満 ⇒ 誕生日の前日まで ※いずれも同じ解釈です

種別(接種回数)		2か月	3か月	6か月	1歳	1歳6か月	2歳	2歳6か月	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	7歳6か月	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	18歳	19歳	20歳
BCG (1回) 対象年齢 1歳に至るまで																										
標準的には生後5か月～8か月に達するまでに1回接種																										
B型肝炎 (3回) 対象年齢 1歳に至るまで																										
27日以上の間隔を置いて2回接種した後、1回目の接種から139日以上の間隔を置いて3回目を接種。(標準的な接種期間は生後2か月～9か月に達するまで)																										
小児用肺炎球菌 対象年齢 2か月～5歳に至るまで ※1回目の接種月齢によって接種回数が変わります。																										
1回目の接種が 2か月～7か月に至るまで ⇒ 4回接種(初回接種(1～3回目)は27日以上の間隔を置いて接種。追加接種(4回目)は3回目接種から60日以上の間隔を置いて1歳以降(標準的には1歳～1歳3か月に至るまで)に1回接種) ※接種の注意点 ⇒ 2回目および3回目の接種は、2歳に至るまで(標準的には1歳まで)に終了させ、2歳を超えたら接種は行わない。(追加接種はできる) また、2回目の接種が1歳を超えた場合、3回目の接種は行わない。(追加接種はできる) 7か月～1歳に至るまで ⇒ 3回接種(初回接種(1～2回目)は27日以上の間隔を置いて接種。追加接種(3回目)は2回目接種から60日以上の間隔を置いて1歳以降に接種) ※接種の注意点 ⇒ 2回目の接種は、2歳に至るまで(標準的には1歳まで)に終了させ、2歳を超えたら接種は行わない。(追加接種はできる) 1歳以上～2歳に至るまで ⇒ 2回接種(60日以上の間隔を置いて接種) 2歳以上～5歳に至るまで ⇒ 1回接種																										
ヒブ 対象年齢 2か月～5歳に至るまで ※1回目の接種月齢によって接種回数が変わります。																										
1回目の接種が 2か月～7か月に至るまで ⇒ 4回接種(初回接種(1～3回目)は27日以上(標準的には27日～56日まで)の間隔を置いて接種。追加接種(4回目)は3回目接種から7か月以上(標準的には7か月～13か月まで)の間隔を置いて1回接種) ※接種の注意点 ⇒ 2回目および3回目の接種は、1歳に至るまでに終了させ、1歳を超えたら接種は行わない。(追加接種は27日以上の間隔を置いて行う) 7か月～1歳に至るまで ⇒ 3回接種(初回接種(1～2回目)は27日以上(標準的には27日～56日まで)の間隔を置いて接種。追加接種(3回目)は2回目接種から7か月以上(標準的には7か月～13か月まで)の間隔を置いて接種) ※接種の注意点 ⇒ 2回目の接種は、1歳に至るまでに終了させ、1歳を超えたら接種は行わない。(追加接種は27日以上の間隔を置いて行う) 1歳以上～5歳に至るまで ⇒ 1回接種																										
四種混合 (1期 4回) (百日せき、ジフテリア、破傷風、不活化ポリオ混合ワクチン)	対象年齢 3か月～7歳6か月に至るまで																									
【1期初回】 20日以上(標準的には20日～56日まで)の間隔を置いて3回接種。(標準的な接種期間は生後3か月に達した時から1歳に達するまで) 【1期追加】 1期初回(3回)接種終了後、 6か月以上(標準的には1年～1年6か月まで)の間隔を置いて1回接種																										
二種混合 (1回) (ジフテリア、破傷風混合ワクチン)	対象年齢 11歳～13歳未満																									
標準的には11歳に達した時から12歳に達するまでの間に1回接種																										
水ぼうそう (2回)	2回 1歳～3歳に至るまで																									
1回目接種後、3か月以上(標準的には6か月～12か月まで)の間隔を置いて2回目を接種。(1回目の標準的な接種期間は1歳から1歳3か月に達するまで)																										
麻しん・風しん混合 (2回)	1期(1回) 1歳～2歳に至るまで																									
	2期(1回) 小学校就学前年度の 4月1日～3月31日の1年間																									
1歳～2歳に至るまでの間に1回接種 1歳になったら早くに受けましょう 3月31日までに受けましょう 小学校就学前年度の4月1日～3月31日の1年間に1回接種(H30年度対象⇒H24.4.2～H25.4.1生まれ)																										
日本脳炎 (1期 3回) 対象年齢 6か月～7歳6か月に至るまで or 20歳未満 (2期 1回) 対象年齢 9歳～13歳未満 or 20歳未満																										
(通常)平成7年4月2日～平成21年10月1日生まれ以外の方 【1期初回】6日以上(標準的には6日～28日まで)の間隔を置いて2回接種 (標準的な接種期間は3歳に達した時から4歳に達するまで) 【1期追加】1期初回(2回)接種終了後、6か月以上(標準的にはおおむね1年を経過した時期)の間隔を置いて1回接種 【2期】標準的には9歳に達した時から10歳に達するまでの間に1回接種 (特例)平成7年4月2日～平成19年4月1日生まれの方 20歳未満まで接種可能 【1期初回】1回目接種後、6日以上(標準的には6日～28日まで)の間隔を置いて2回目を接種 【1期追加】1期初回(2回)接種終了後、6か月以上(標準的にはおおむね1年を経過した時期)の間隔を置いて1回接種 【2期】9歳以上で1期初回(3回)接種完了後、6日以上の間隔を置いて1回接種																										
※平成25年6月時点で副反応が一定頻度みられたため、積極的な接種を控えています。																										
子宮頸がん予防ワクチン (女性のみ3回) 対象年齢 小学6年生～高校1年生 (平成14年4月2日～平成19年4月1日生まれ)																										
6か月間に3回接種します。(ワクチンによって接種間隔が違います) ワクチン名 初回接種 1か月後 2か月後 3か月後 4か月後 5か月後 6か月後 サーバリックス 1回目 2回目 2回目接種から2か月半以上あける 3回目 ガーダシル 1回目 → 2回目 2回目から3か月以上あける 3回目																										
小学6年生～高校1年生(平成14年4月2日～平成19年4月1日生まれ)																										

生ポリオワクチンは現在、廃止されています。代わりに不活化ポリオと四種混合ワクチンまたは三種混合ワクチンで接種を完了してください。

種別(接種回数)		2か月	3か月	6か月	1歳	1歳6か月	2歳	2歳6か月	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	7歳6か月	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	18歳	19歳	20歳
・不活化ポリオ (4回) 対象年齢 両方とも3か月～7歳6か月に至るまで ・四種混合 (1期 4回) (百日せき、ジフテリア、破傷風、不活化ポリオ混合ワクチン) 四種混合を接種する方も11歳～13歳未満で二種混合を1回接種します。																										
【1期初回】 20日以上(標準的には20日～56日まで)の間隔を置いて3回接種。(標準的な接種期間は生後3か月に達した時から1歳に達するまで) 【1期追加】 1期初回(3回)接種終了後、 6か月以上(標準的には1年～1年6か月まで)の間隔を置いて1回接種																										

問い合わせ ぽけん福祉課(すこやかセンター伊野内) TEL 893-3811
青北総合支所住民福祉課 TEL 867-2300
本川総合支所住民福祉課 TEL 869-2114
受付時間 平日8時30分～17時15分(土・日・祝日・年末年始を除く。)