

## 血をサラサラにする薬を飲まれている方へ

飲んでいるお薬によっては、出血をすると止まりにくいことがあるので、  
予診票でお薬の種類をおたずねします。

**ワクチンを受けることはできますが、接種後の出血に注意が必要です。**

### 接種(筋肉注射)にあたっての注意

**!** 接種後は、2分間以上、しっかり押さえてください。

- ・腕が腫れる・しびれるなどの症状が出たら、医師にご相談ください。
- ・接種にあたって、お薬の休薬は必要ありません。

### 対象のお薬

### 抗凝固薬

商品名	一般名
ワーファリン	ワルファリンカリウム
プラザキサ	ダビガトランエテキシラート
イグザレルト	リバーロキサバン
エリキュース	アピキサバン
リクシアナ	エドキサバントシル酸塩水和物

血をサラサラにする薬には次のような薬もありますが、通常どおり接種を受けていただけます。

### 抗血小板薬など

動脈硬化、狭心症・心筋梗塞、脳梗塞後、下肢動脈閉塞症の方に処方されることが多いお薬です。

商品名	一般名	商品名	一般名
バイアスピリン	アスピリン	コンプラビン配合錠	アスピリン・クロピドグレル硫酸園
パナルジン	チクロピジン塩酸塩	タケルダ配合錠	アスピリン・ランソプラゾール
プラビックス	クロピドグレル硫酸塩		
エフィエント	プラスグレル塩酸塩	エパデール	イコサペント酸エチル(EPA)
プレタール	シロスタゾール		
バファリン	アスピリン・ダイアルミネート配合剤	ドルナー、プロサイリン	ベラプロストナトリウム
ブリリント	チカグレロル	アンプラーグ	サルポグレラート塩酸塩

など