◇定期予防接種一覧(令和6年4月時点) ☆歳に至るまで ⇒ 誕生日の前日まで ☆歳に達するまで ⇒ 誕生日の前日まで ★ の期間中であればいつでも接種可能ですが、できるだけ の標準的な接種年齢で受けましょう。 ☆歳未満 ⇒ 誕生日の前日まで ※いずれも同じ解釈です 種別(接種回数) ロタ(1価) (2回) 対象年齢 生後6週~24週まで 27日以上の間隔をあけて2回接種 1回目の接種は の生後2月~14週6日までにしましょう。 どちらかで接種 を完了しましょう ロタ(5価) (3回) 対象年齢 生後6週~32週まで 27日以上の間隔をあけて3回接種 1回目の接種は の生後2日~14週6日までにしましょう BCG 対象年齢 1歳に至るまで 標準的には生後5か月~8か月に至るまでに1回接種 B型肝炎 (3回) 対象年齢 1歳に至るまで 27日以上の間隔をおいて2回接種した後、1回目の接種から139日以上の間隔をおいて3回目を接種。(標準的な接種期間は生後2か月~9か月に達するまで) 小児用肺炎球菌 2か月~7か月に至るまで ⇒ 4回接種(初回接種(1~3回目)は27日以上の間隔をおいて接種。追加接種(4回目)は3回目接種から60日以上の間隔をおいて1歳以降(標準的には1歳~1歳3か月に至るまで)に「回接種) ※接種の注意点 ⇒ 2回目および3回目の接種は、2歳に至るまで(標準的には1歳まで)に終了させ、2歳を超えたら接種は行わない。(追加接種はできる) 対象年齢 2か月~5歳に至るまで また、2回目の接種が1歳を超えた場合、3回目の接種は行わない。(追加接種はできる) 7か月~1歳に至るまで ⇒ 3回接種(初回接種(1~2回目)は27日以上の間隔をおいて接種。追加接種(3回目)は2回目接種から60日以上の間隔をおいて1歳以降に接種) ※1回目の接種月齢によって接種回数が変わります。 ※接種の注意点 ⇒ 2回目の接種は、2歳に至るまで(標準的には1歳まで)に終了させ、2歳を超えたら接種は行わない。(追加接種はできる) 1歳以上~2歳に至るまで ⇒ 2回接種(60日以上の間隔をおいて接種) 2歳以上~5歳に至るまで ⇒ 1回接種 五種混合 対象年齢 【1期追加】 (1期 4回) 20日以上(標準的には20日~56日まで) 1期初回(3回)接種終了後、 百日せき、ジフテリア、破傷風、不活化ポリオ、Hit の間隔をおいて3回接種。(標準的な接種 6か月以上(標準的には1年~1年6か月まで)の間隔をおいて1回接種 2か月~7歳6か月に至るまで 混合ワクチン 期間は生後3か月から1歳に至るまで) 二種混合 (1回) 「ジフテリア、破傷風混合ワクチン」 対象年齢 11歳~13歳に至るまで 標準的には11歳から12歳に至るまでの間に1回接種 水ぼうそう (2回) 1歳~3歳に至るまで 1回目接種後、3か月以上(標準的には6か月~12か月まで)の間隔をおいて2回目を接種。(1回目の標準的な接種期間は1歳から1歳3か月に至るまで) 1期(1回) 1歳になったら早くに受けましょう 1歳~2歳に至るまで 1歳~2歳に至るまでの間に1回接種 麻しん・風しん混合 (2回) 2期(1回) 3月31日までに受けましょう 小学校就学前年度の 小学校就学前年度の4月1日~3月31日の1年間に1回接種(R6年度対象⇒H30.4.2~H31.4.1生まれ) 4月1日~3月31日の1年間 (通常)平成7年4月2日~平成21年10月1日生まれ以外の方 日本脳炎 【1期初回】6日以上(標準的には6日~28日まで)の間隔をおいて2回接種 【2期】標準的には9歳から10歳に至るまでの間に1回接種 (1期 3回) (標準的な接種期間は3歳から4歳に至るまで) 対象年齢 6か月~7歳6か月に至るまで or 20歳に至るまで 【1期追加】1期初回(2回)接種終了後、6か月以上(標準的にはおおむね1年を経過した時期) の間隔をおいて1回接種 (特例)平成7年4月2日~平成19年4月1日生まれの方 (2期 1回) 【1期初回】1回目接種後、6日以上(標準的には6日~28日まで)の間隔をおいて2回目を接種 対象年齢 9歳~13歳に至るまで or 20歳に至るまで 【1期追加】1期初回(2回)接種終了後、6か月以上(標準的にはおおむね1年を経過した時期)の間隔をおいて1回接種 【2期】9歳以上で1期初回(3回)接種完了後、6日以上の間隔をおいて1回接種 6か月間に接種します。(ワクチンによって接種間隔が違います) **子宮頸がん予防ワクチン**(女性のみ3回) 動 常 小学6年生~高校1年生(平成19年4月2日~平成24年4月1日生) デャッチアップ 令和7年3月31日まで(平成9年4月2日~平成20年4月1日生) 5か月後 初回接種 1か月後 2か月後 3か月後 4か月後 6か月後 サーバリックス 1回目 2回目接種から2か月半以上あける 3回目 2回目 小学6年生~高校1年生(平成20年4月2日~平成25年4月1日生まれ) ガーダシル 1回目 2回目 2回目から3か月以上あける 3回目 シルガート 2回目から3か月以上あける 3回目 キャッチアップ < 積極的勧奨の差控えにより接種機会を逃した方に対して公平な接種機会を確保する観点から、平成9年4月2日~平成20年4月1日生の方は、令和7年3月31日まで定 シルガード ※1回目を15歳未満で接種した場合 月接種の対象となります。 108 最低5か月以上あける 2回目 令和7年3月31日まで(平成9年4月2日~平成20年4月1日年 ヒブ、四種混合を接種済みの場合は、引き続きそれぞれ個別に接種してください。 1回目の接種が 2か月~7か月に至るまで ⇒ 4回接種(初回接種(1~3回目)は27日以上(標準的には27日~56日まで)の間隔をおいて接種。追加接種(4回目)は3回目接種から7か月以上(標準的には7か月~13か月まで)の間隔をおいて1回接種) ※接種の注意点 ⇒ 2回目および3回目の接種は、1歳に至るまでに終了させ、1歳を超えたら接種は行わない。(追加接種は27日以上の間隔をおいて行う) 対象年齢 2か月~5歳に至るまで 7か月~1歳に至るまで ⇒ 3回接種(初回接種(1~2回目)は27日以上(標準的には27日~56日まで)の間隔をおいて接種。追加接種(3回目)は2回目接種から7か月以上(標準的には7か月~13か月まで)の間隔をおいて接種) ※接種の注意点 ⇒ 2回目の接種は、1歳に至るまでに終了させ、1歳を超えたら接種は行わない。(追加接種は27日以上の間隔をおいて行う) ※1回目の接種月齢によって接種回数が変わります。 1歳以上~5歳に至るまで ⇒ 1回接種 四種混合 【1期追加】

対象年齢

2か月~7歳6か月に至るまで

(1期 4回)

百日せき、ジフテリア、破傷風、不活化ポリオ

混合ワクチン

【1期初回】

20日以上(標準的には20日~56日まで)

期間は生後3か月に達した時から1歳に

1期初回(3回)接種終了後、

の間隔をおいて3回接種。(標準的な接種 6か月以上(標準的には1年~1年6か月まで)の間隔をおいて1回接種

問い合わせ ほけん福祉課(すこやかセンター伊野内) 吾北総合支所住民福祉課 TEL 867-2300 本川総合支所住民福祉課 TEL 869-2112 受付時間 平日8時30分~17時15分(土·日·祝日·年末年始を除く。)